

Så använder du AeroBec[®] Inhalationsspray



Till dig som ordinerats detta läkemedel.

Varför AeroBec Inhalationsspray?

Det här läkemedlet har ordinerats av din läkare, för att behandla din astma.

Det är viktigt att du följer de instruktioner och den dos som din läkare ordinerat även om du känner dig bättre. Hör av dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor. Läs bipacksedeln i förpackningen eller på www.fass.se.

Den här typen av medicin används i förebyggande syfte och måste tas regelbundet, även när det inte finns några tecken på symtom. Full effekt förväntas först efter ca 10 dagars behandling.

Rengör din inhalationsspray

Munstycket torkas på utsidan med en ren och torr trasa eller servett. Varken behållaren eller plastmunstycket får komma i kontakt med vatten.

Hur vet jag när AeroBec Inhalationsspray är tom?

När du inte kan känna någon vätska när du skakar den lätt, eller om det inte kommer någon puff när du testar att trycka av en dos i luften, då är den tom.

Skötselråd

- Använd före utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Undvik hög värme som direkt solljus.
- Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Så här använder du AeroBec Inhalationsspray



Tryck ut 2 puffar i luften om det är första gången du använder inhalationssprayen eller om det gått minst 2 veckor sedan sist.

Om du ska ta fler inhalationer: Upprepa samtliga steg.

För mer information,
läs bipacksedeln i
förpackningen eller
på www.fass.se

Scanna QR-kod för instruktionsfilm på hur du använder AeroBec Spray



AeroBec®(beklometason). Inhalationsspray, lösning. Receptbelagt läkemedel.

Användning: AeroBec används vid astma. Den här typen av medicin används i förebyggande syfte och måste tas regelbundet, även när det inte finns några tecken på symtom. Full effekt förväntas först efter ca 10 dagars behandling. **Varningar och**

försiktighet: Tala med läkare eller sjuksköterska under tiden du använder AeroBec om du:

- upplever att effekten av AeroBec försämras, t.ex. om du oftare får astmaattacker. Du kanske behöver ändra din läkemedelsbehandling
- har svåra infektioner eller inför ett kirurgiskt ingrepp. Din läkare kan överväga tillägg av kortisontabletter till din vanliga behandling under påfrestande perioder
- upplever dimsyn eller andra synrubbingar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.** AeroBec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. AER-SE-00014 April 2025

Teva Sweden AB

Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg
Tel 042 12 11 00 | www.teva.se | info@teva.se

