



Tacforius
takrolimus depotkapsel

Patientinformation

Tacforius

(takrolimus depotkapsel)

Denna information lämnas ut av vårdgivare till dig som ordinerats behandling med Tacforius.

Tacforius är ett receptbelagt läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

Patientinformation

Tacforius (takrolimus depotkapsel)

Denna information lämnas ut av vårdgivare till dig som ordinerats behandling med Tacforius. Tacforius är ett receptbelagt läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta det transplanterade organet.

För fullständig information, läs bipacksedeln noggrant. Vid frågor, kontakta din läkare.

Vid byte tänk på, när du börjar ta Tacforius ska du inte längre ta det läkemedel med takrolimus som du tidigare ordinerats.

Introduktion

Din läkare har skrivit ut Tacforius som innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det är ett immunsuppressivt läkemedel. Efter en organtransplantation (lever, njure) försöker kroppens immunförsvar att stöta bort det nya organet. Tacforius används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp, för att den ska acceptera det transplanterade organet. Du kan också få Tacforius mot en pågående avstötningsreaktion mot din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, när annan behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation. Tacforius används till vuxna.

Så använder du Tacforius

Tacforius skall alltid tas enligt din läkares anvisningar. Tacforius tas via munnen en gång dagligen på morgonen. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Dosen är beroende av ditt allmäntillstånd och på vilket/vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du

får. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta.

Om du har tagit för stor mängd av Tacforius

Om du av misstag har tagit för många kapslar, kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart.

Om du har glömt att ta ditt läkemedel

Om du har glömt att ta dina Tacforius-kapslar på morgonen, ta dem så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos nästa morgon.

Tacforius och andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du behöver besöka en annan läkare än din transplantationsspecialist ska du tala om för läkaren att du tar takrolimus. Läkaren kan behöva rådgöra med din transplantationsspecialist om du ska använda ett annat läkemedel som kan öka eller minska takrolimuskoncentrationen i blodet.

Tacforius
takrolimus depotkapsel

Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tacforius försvagar kroppens försvarsmekanismer (immunförsvaret), vilket gör att kroppens förmåga att bekämpa infektioner blir sämre. När du tar Tacforius kan du därför få fler infektioner än vanligt. Vid nyttillkomna symptom och/eller uttalade besvär kontakta läkare omedelbart.

Solen

Du bör begränsa exponeringen för sol och UV-ljus (ultraviolett ljus) medan du tar Tacforius. Använd lämplig skyddande klädsel och solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Takrolimus utsöndras i bröstmjolk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacforius.



Så fungerar byte till generiskt alternativ

Det är Läkemedelsverket som beslutar om vilka generiska läkemedel som får vara utbytbara på apoteket och vilka som bara kan bytas ut av din läkare. Läkemedel med takrolimus får inte bytas ut på apotek, men din läkare kan besluta om ett byte. Detta sker då på ett kontrollerat sätt för att säkerställa god behandlingseffekt, vilket kan innebära någon eller några extra provtagningar för att kontrollera blodkoncentrationen av läkemedlet.

Expediering av ditt läkemedel på apotek

Tacforius får inte bytas ut på apotek mot någon annan tillverkare av produkter med takrolimus. Det kan vara bra att informera ditt apotek när du bytt läkemedel så att det finns i lager när du behöver det. Om du går till ett annat apotek kan det vara bra att kontakta det en eller ett par dagar i förväg. Apoteken ska normalt kunna expediera det efterfrågade läkemedlet inom 24 timmar.



Så här förvarar du Tacforius

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fukt känsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar. Använd alla depotkapslarna inom ett år efter att aluminiumomslaget öppnats. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

OBS! Läs noggrant hela bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Tacforius (takrolimus) receptbelagt läkemedel, hård depotkapsel, styrkor 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg förpackningar 50 st. Användning: Tacforius tillhör en grupp läkemedel som heter immunsuppressiva medel. Efter en organtransplantation i t.ex. lever eller njure, kommer din kropps immunförsvar att försöka stöta bort det nya organet. Tacforius används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet. Tacforius används ofta i kombination med andra läkemedel som också sätter ner immunförsvaret. Du kan även få Tacforius vid en pågående avstötningsreaktion hos din transplanterade lever eller njure eller om någon tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation. Takrolimus som finns i Tacforius kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Tacforius används till vuxna. Varningar och försiktighet: Använd inte Tacforius, om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller mot något av övriga innehållsämnen i Tacforius eller om du är allergisk (överkänslig) mot något antibiotikum som tillhör undergruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin eller josamycin). Du bör begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus. Graviditet och amning: Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Tacforius utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacforius. Körförmåga: Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömning, eller har problem att se klart efter att du tagit Tacforius. Dessa effekter är vanligare om du även dricker alkohol.



Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tel: +46 (0)42-121 100, info@teva.se, www.teva.se